

Tableau Général des Vaccinations en Officine

mise-à-jour : mai 2022

Vaccin	Vaccinateur autorisé en Officine	Type de Vaccination Administrée en officine	Public Cible	Schéma Initial	Modalités de Rappel	Rattrapage (si schéma incomplet)
Grippe Saisonnière	PHARMACIEN PRÉPARATEUR (dans le cadre de la dérogation exceptionnelle)	Initiale Rappel	65 ans et +, Personnes à risque	1 dose	1 dose / an	Oui (Une seule dose suffit pour être vacciné)
COVID-19	PHARMACIEN PRÉPARATEUR (dans le cadre de la dérogation exceptionnelle)	Initiale Rappel	5 ans et plus	2 doses	1 dose à min 3 mois et max 4 mois	Oui
Tétanos Diphtérie Poliomyélite	PHARMACIEN	Initiale Rappel	Rappel : 25 ans, 45 ans, 65 ans, puis tous les 10 ans (75,85...) Initiale : Tous les adultes	3 doses + 2 doses de rappel	1 dose selon le calendrier vaccinal	Oui
Coqueluche	PHARMACIEN	Initiale Rappel	Rappel : 25 ans si la dernière dose date de plus de 5 ans. Si le patient ne fait pas son rappel à 25 ans il a jusqu'à 39 ans pour le faire. En cas d'infection documentée de la coqueluche avant le rappel, le patient peut se faire vacciner plus de 10 ans après l'infection. Femmes enceintes et/ou entourage d'une femme enceinte. Initiale : Tous les adultes	3 doses + 2 doses de rappel	1 dose	Oui (cf limite d'âge)
Papillomavirus Humains	PHARMACIEN	Initiale	Rappel : Pas de rappel Initiale : Tous de 15 à 19 ans, Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes jusqu'à 26 ans	3 doses	/	Oui (cf limite d'âge)
Méningocoque Séro groupe C	PHARMACIEN	Initiale Rappel	Rappel : Pas de rappel Initiale : Pour tous jusqu'à 24 ans	1 dose	/	Oui (cf limite d'âge)
Hépatite A	PHARMACIEN	Initiale	Rappel : Pas de rappel Initiale : Voyageurs, exposition, personnes atteintes de Mucoviscidose, maladie du foie, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes	3 doses + 2 rappels	/	Oui (adapter les doses selon le schéma déjà effectué)
Hépatite B	PHARMACIEN	Initiale	Rappel : Pas de rappel Initiale : Voyageurs, exposition, Thanatopracteurs, détenus ou anciens détenus ; candidat à une greffe d'organe ; usagers de drogues injectables ; patient infecté par le VIH	2 doses + 1 rappel	/	Oui (adapter les doses selon le schéma déjà effectué)
Méningocoque Séro groupe B	PHARMACIEN	Initiale	Rappel : Recommandé tous les 5 ans pour les personnes présentant un risque continu d'exposition Initiale : Recommandé pour les personnes présentant certaines maladies du sang ; entourage de personne à risque	2 doses OU 2 doses + 1 rappel	1 dose selon le calendrier vaccinal	Non
Méningocoque Séro groupe ACYW	PHARMACIEN	Initiale Rappel	Rappel : Recommandé tous les 5 ans pour les personnes présentant un risque continu d'exposition Initiale : Recommandé pour les personnes présentant certaines maladies du sang	2 doses + 1 rappel	1 dose selon le calendrier vaccinal	Non
Pneumocoque	PHARMACIEN	Initiale Rappel	Rappel : Pas de rappel Initiale : Pour les personnes non vaccinées à risque élevé d'infections sévères à pneumocoque	2 doses	/	Oui
Rage	PHARMACIEN	Initiale Rappel	Rappel : Pour certains professionnels Initiale : Pour les personnes régulièrement exposées aux virus de la rage, voyageurs	3 doses	1 dose / 5 ans pour les personnes concernées	Oui (cf public cible)